

Enfermedades contra las que te protegen tus vacunas:

COVID-19: Infección viral contagiosa que se adquiere por vía respiratoria. Se complica con neumonía, coágulos en la sangre, daño al hígado, corazón, riñones, COVID persistente, muerte

Influenza: Infección viral contagiosa de la nariz, la garganta y, a veces, los pulmones. Se complica con Neumonía, infección de oído y sinusitis, empeoramiento de afecciones subyacentes, como enfermedad del corazón o los pulmones, muerte

Tétanos (trismo): Infección causada por esporas bacterianas que se encuentran en la tierra y el polvo en todas partes; las esporas ingresan al cuerpo a través de heridas o cortes en la piel. Espasmos musculares involuntarios repentinos, espasmos en la mandíbula, convulsiones, fractura de huesos, dificultad para respirar, muerte.

Difteria: Infección viral contagiosa de la nariz, la garganta y, a veces, los pulmones. Formación de una membrana gruesa, gris, que se acumula en la garganta o la nariz y puede hacer difícil respirar y tragar, fallo del corazón, lesión del cerebro, coma, muerte

Tosferina (pertussis): Infección bacteriana contagiosa de los pulmones y las vías respiratorias. Accesos de tos graves, pausas en la respiración que pueden ser mortales, neumonía, muerte; especialmente peligrosa para los bebés

Sarampión: Infección viral contagiosa que causa fiebre alta, tos, ojos enrojecidos, moqueo y sarpullido. Inflamación del cerebro, neumonía, muerte

Paperas: Infección viral contagiosa que causa fiebre, cansancio, hinchazón de las mejillas e inflamación y sensibilidad en la mandíbula. Inflamación del cerebro, dolor o inflamación en los testículos o los ovarios, sordera, muerte

Rubéola: Infección viral contagiosa que causa fiebre leve, dolor de garganta y sarpullido. Muy peligrosa en las personas embarazadas; puede causar aborto espontáneo o muerte fetal, parto prematuro, defectos de nacimiento graves

Varicela: Infección viral contagiosa que causa fiebre, dolor de cabeza y un sarpullido con ampollas y picazón. Llagas infectadas, inflamación del cerebro, neumonía, muerte

HPV (virus del papiloma humano, VPH): Infección viral contagiosa que se propaga por contacto sexual; a veces causa verrugas genitales. Muchos tipos de cáncer, incluido el cáncer de cuello uterino, de vagina, de pene, de ano, y de garganta

Enfermedad neumocócica: Infección bacteriana de los oídos, los senos paranasales, los pulmones o el torrente sanguíneo. Depende de la parte del cuerpo infectada, pero puede incluir neumonía, septicemia, infección del tejido que recubre el cerebro y la médula espinal, muerte

Hepatitis A: Infección viral contagiosa del hígado propagada por alimentos o bebidas contaminados, o por el contacto cercano con una persona infectada. Insuficiencia del hígado, piel u ojos amarillentos, dolor de estómago, vómitos, fiebre, diarrea, fatiga, muerte

Hepatitis B: Infección viral contagiosa del hígado propagada a través del contacto con líquidos corporales infectados, como la sangre o el semen. Insuficiencia del hígado, piel u ojos amarillentos, dolor de estómago, vómitos, fiebre, diarrea, fatiga, muerte

Enfermedad meningocócica: Infección bacteriana del tejido que recubre el cerebro y la médula espinal o del torrente sanguíneo. Fiebre, dolor de cabeza, rigidez de cuello, sensibilidad a la luz, confusión, pérdida de un brazo o una pierna, sordera, convulsiones, muerte

Vacunas recomendadas para los niños desde los 7 hasta los 18 años 2025.



Indica cuándo se recomienda la vacuna para todos los niños, a menos que su médico le diga que su hijo no puede recibir la vacuna de manera segura.



Indica que la vacuna se debe administrar si la persona se está poniendo al día con vacunas saltadas. No es necesario volver a iniciar una serie de vacunas, independientemente de la cantidad de tiempo que haya pasado entre las dosis

COVID-19

La cantidad de dosis recomendadas depende de la edad de su hijo y el tipo de vacuna contra el COVID-19 usada.

VIPH

Todas las personas de entre 11 y 12 años deberían ponerse una serie de 2 dosis con un intervalo de entre 6 y 12 meses. Esta serie se puede comenzar cuando tengan 9 años. Se recomienda una serie de 3 dosis para las personas con el sistema inmunitario debilitado o que comiencen la serie después de haber cumplido los 15 años.

¡Pide tus vacunas con nosotros!

Dr. Alejandro Jiménez, WhatsApp: 5554334930

Yazmin Pérez, WhatsApp: 55 7376 2613